カナ	:
名前	:
生年月日	:

造影CT検査
～糖尿病薬を服用している方へ～

ヨード造影剤とビグアナイド系糖尿病薬との併用注意について

ヨード造影剤とビグアナイド系糖尿病薬の併用により乳酸アシドーシスをきたすことがあるため併用注意とされています。原因は、ヨード造影剤の投与により一過性の腎機能低下をきたす可能性があり、その結果、ビグアナイド系糖尿薬の腎排泄が減少し血中濃度が上昇するためと考えられています。そのため腎機能低下のある患者様に糖尿病薬の服用を一時的に中止していただく必要があります。（ただし、緊急に検査を行う必要が場合を除く）また投薬の再開は、検査48時間後に主治医の判断で再開となります。

＊乳酸アシドーシスの症状について
悪心、腹痛、下痢、筋肉痛、倦怠感などの症状が現れた場合は、直ちに連絡して下さい。

休薬の流れ

1.休薬するお薬

【　　】

2.休薬期間

検査前		検査日		検査後
月　日	→	月　日	→	月　日
（　：　）		（　：　）		（　：　）

メモ

岩手県立一戸病院
〒028-5312　岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森60-1
☎　(0195)33-3101

作成：令和４年4月